

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 00 Aprobado: GTD Fecha: 03-09-2024 Página 1 de 2
		

Producto	:	STRACTA OH MAX
Ingrediente activo	:	Extracto de Ortiga 150 g/L Aceite de Ricino 50 g/L
Formulación	:	Concentrado soluble (SL)
Clase de uso	:	Insecticida biológico de uso Agrícola
Registro	:	N° 0338-SENASA-PBA-EV
Titular	:	SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Distribuidor	:	SILVESTRE PERÚ S.A.C.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

STRACTA® OHMAX es un insecticida biológico agrícola categorizado como **LIGERAMENTE TÓXICO**.

MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN

STRACTA® OHMAX es un insecticida de contacto, a base de extracto de ortiga y aceite de ricino, el cual actúa interfiriendo en los procesos metabólicos que afectan la capacidad de alimentarse y reproducirse de los insectos. Asimismo, afecta la integridad de la membrana celular, provocando la pérdida de iones y líquidos, lo que conduce a la deshidratación y posteriormente, la muerte.

STRACTA® OHMAX tiene también un efecto repelente, pues contiene compuestos que tienen un olor no agradable o de efecto irritante para el insecto. Debido a ello, el insecto abandona la planta cuando trata de alimentarse del tejido vegetal.

STRACTA® OHMAX no deja residuos en cosechas ya que su plazo de seguridad es cero días. Es compatible con el medio ambiente, no tóxico para las plantas ni para el hombre, aves, mamíferos, peces y adultos de insectos predadores, parásitos y útiles (polinizadores).

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Evaluar la presencia de la plaga antes de proceder con la aplicación de **STRACTA® OHMAX**
- Realizar la aplicación cuando las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, radiación y viento) sean favorables.
- Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.
- Asegurarse que la aplicación del producto sea uniforme, verificar que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.
- Rotar con productos de diferente modo de acción, para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga.
- Agregar Trumex (surfactante trisiloxano) 0.05% para una mayor eficacia, en la etapa de fructificación del arándano no aplicar el coadyuvante por probable pérdida de la pruina.

	FICHA TÉCNICA		Revisión: 00 Aprobado: GTD Fecha: 03-09-2024 Página 2 de 2
			

COMPATIBILIDAD

STRACTA® OHMAX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto aguas carbonatadas y productos a base de cobre. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

STRACTA® OHMAX no es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARÁNDANO	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	0.4 - 0.6	No aplica	No aplica
MANDARINA	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.3 - 0.5	No aplica	No aplica
PALTO	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.2 - 0.5	No aplica	No aplica
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.3 - 0.5	No aplica	No aplica

PC: Periodo de Carencia.

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS

STRACTA® OHMAX, por ser un insecticida biológico, está exento de LIMITE MÁXIMO DE RESIDUOS o Tolerancias de Residuos.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

