

Producto	:	CAL-OMEX®
Clase de uso	:	Fertilizante Foliar
Formulación	:	Suspensión Concentrada
Distribuidor	:	SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Composición	:	Calcio (CaO)..... 22.50 % p/v Nitrógeno Total 15.00 % p/v Nitrato 12.10 % p/v Amonio 0.90 % p/v Úrea 2.00 % p/v Magnesio (MgO)..... 3.00 % p/v Manganeso Mn (EDTA) 0.15 % p/v Hierro (Fe) (EDTA)..... 0.075 % p/v Boro (B) 0.075 % p/v Cobre (Cu) (EDTA) 0.06 % p/v Zinc (Zn) (EDTA) 0.03 % p/v Molibdeno (Mo) 0.0015 % p/v

CARACTERÍSTICAS

CAL - OMEX® es un FERTILIZANTE FOLIAR soluble. CAL - OMEX® por su alto contenido de calcio es indispensable para el crecimiento, floración y fructificación de los cultivos, porque es componente de la pared y membrana celular. Interviene en diversas funciones bioquímicas de la planta como división y elongación celular, maduración de frutos, germinación de la semilla, etc. El calcio reduce la producción de etileno en los cultivos y estimula la resistencia natural a las enfermedades y plagas.

COMPATIBILIDAD

CAL - OMEX® es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes foliares de uso agrícola, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

EFFECTO SOBRE LOS CULTIVOS

CAL - OMEX® no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	MOMENTOS DE APLICACIÓN	DOSIS	
		L/ha	L/200 L
AJÍ PÁPRIKA, PAPA, TOMATE, PIQUILLO Y OTRAS SOLANÁCEAS	Para evitar la caída de flores y frutos en: <ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento vegetativo. • Prefloración. • Desarrollo del fruto (después del cuajado) o tubérculos. 	1 - 2	0.5 - 1
AJO Y CEBOLLA	Para mayor tolerancia a enfermedades: <ul style="list-style-type: none"> • En la fase inicial del cultivo. • En plena bulbificación. • Al inicio de la maduración. 	1 - 2	0.5 - 1
ALCACHOFA	Mejor desarrollo y vida útil de capítulos: <ul style="list-style-type: none"> • 10 días después del trasplante. • Prefloración (2 aplicaciones cada 10 días). 	1 - 2	0.5 - 1
ALGODONERO	<ul style="list-style-type: none"> • Al inicio del botoneo. • Al botoneo 	1 - 2	0.5 - 1
APIO, BRÓCOLI, COLIFLOR, LECHUGA	Para evitar el "Corazón Negro": <ul style="list-style-type: none"> • A los 10 días después del trasplante. • Cuando se observen los síntomas clásicos del "Corazón Negro" (aplicación correctiva 1.0 L / 200 L) 	1 - 2	0.5 - 1
ARROZ, TRIGO, MAÍZ	<ul style="list-style-type: none"> • En prefloración. • En punto de algodón. • Llenado de grano. 	1 - 2	0.5 - 1
ARVEJA, VAINITA, FREJOL, HABAS	<ul style="list-style-type: none"> • Prefloración. • Crecimiento de vaina. 	1 - 2	0.5 - 1
ARVEJA, VAINITA, FREJOL, HABAS	<ul style="list-style-type: none"> • Prefloración. • Crecimiento de vaina. 	1 - 2	0.5 - 1
CÍTRICOS, MELOCOTONERO, MANGO, MANZANO PALTO, OLIVO	Para aumentar la firmeza del fruto evitando su caída y rajado en: <ul style="list-style-type: none"> • Prefloración. • Floración. • Crecimiento y desarrollo del fruto. 	2 - 3	1.0
ESPÁRRAGO	Evita la muerte de brotes y deformación de turiones (aplicación vía sistema de riego o foliar) <ul style="list-style-type: none"> • Al inicio del primer brotamiento. • Al inicio del segundo brotamiento. • Al inicio del tercer brotamiento. 	2 - 4	1.0
FRESA	Mayor rendimiento y calidad, mayor resistencia a <i>Botrytis</i> . <ul style="list-style-type: none"> • En prefloración y 3 veces más cada 14 días y cuando sea necesario. 	1 - 2	0.5 - 1
ORNAMENTALES	Prefloración. Fase inicial.	1 - 2	0.5 - 1
MELÓN, ZAPALLO, SANDÍA Y OTRAS CUCURBITÁCEAS.	Para evitar pudrición y caída de flores: <ul style="list-style-type: none"> • Prefloración. • Después del cuajado. 	1 - 2	0.5 - 1
VID	Para evitar la muerte de los pedúnculos o palo negro y el corrido o desgrane del racimo. <ul style="list-style-type: none"> • En prefloración y luego 3 veces más cada 14 días. 	2 - 4	1.0

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS



- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

CAL - OMEX® cuenta con las siguientes presentaciones: 500 ml, 1 L, 4 L, 20 L, 200 L.